

Mathematik 2 für Elektrotechnik

Klausur vom 20. September 2010

Jörn Loviscach

Versionsstand: 19. September 2010, 22:24

Drei Punkte pro Aufgabe. Mindestpunktzahl zum Bestehen: 15 Punkte. Hilfsmittel: maximal acht einseitig oder vier beidseitig beschriftete DIN-A4-Spickzettel beliebigen Inhalts, möglichst selbst verfasst oder zusammengestellt; kein Skript, keine andere Formelsammlung, kein Taschenrechner, kein Computer, kein Handy.

Name	Vorname	Matrikelnummer	E-Mail-Adresse

Fingerübungen

1. Im \mathbb{R}^3 sind zwei Geraden gegeben: die Gerade durch die Punkte (5|3|1) und (6|5|4) und die Gerade durch die Punkte (4|3|2) und (2|-1|-4). Sind diese beiden Geraden parallel zueinander? Begründung!
2. Bestimmen Sie einen (einer reicht!) Eigenvektor dieser Matrix (keine eindeutige Lösung):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 14 & 4 \end{pmatrix}$$

3. Finden Sie die *allgemeine* Lösung der Differentialgleichung $y'' + 4y' + 8y = 0$.
4. Finden Sie durch Trennung der Variablen die Lösung der Differentialgleichung $y' \stackrel{!}{=} \sqrt{xy}$ zur Anfangsbedingung $y(3) \stackrel{!}{=} 5$.
5. Bestimmen Sie den komplexen Fourier-Koeffizienten c_4 für die Funktion f , welche die Periode 4 hat und für $-2 \leq t < 2$ durch $f(t) := t$ gegeben ist.
6. Hat die Funktion $f(x, y) := \frac{4}{3}x^3 + x^2 - x - 2xy + y^2$ an irgendeiner Stelle $(x_0|y_0) \in \mathbb{R}^2$ ein lokales Minimum? Wenn ja, an welchem $(x_0|y_0)$? Begründen Sie das mit den ersten und zweiten Ableitungen.

Bitte wenden!

Kreative Anwendung

7. Geben Sie im \mathbb{R}^3 einen Vektor (aber nicht den Nullvektor) an, der in der yz -Ebene liegt und senkrecht auf dem Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ steht (keine eindeutige Lösung).
8. Sind lineare Gleichungssysteme mit der Koeffizientenmatrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$
- immer lösbar,
 - typischerweise lösbar,
 - selten lösbar oder
 - nie lösbar?
- Begründen Sie Ihre Antwort mit dem Rang oder mit dem Defekt dieser Matrix.
9. Finden Sie eine *spezielle* Lösung der Differentialgleichung $y'' - y \stackrel{!}{=} e^x$.
10. Skizzieren Sie in der komplexen Zahlenebene alle Zahlen z , die $z^3 = j$ erfüllen.
11. Der natürliche Logarithmus wird durch seine Tangentengerade an $x_0 = 5$ genähert. Schätzen Sie den Fehler dieser Näherung auf dem Bereich $4 \leq x \leq 6$ konservativ mit Hilfe der zweiten Ableitung.
12. Im \mathbb{R}^2 ist das Dreieck mit den Eckpunkten $(1|2)$, $(4|2)$ und $(4|5)$ gegeben. Integrieren Sie die Funktion $(x|y) \mapsto x \cdot y$ über dieses Dreieck. Lassen Sie das Ergebnis als Summe von Brüchen stehen.